

定期的な服用のお薬：ミヤBM錠



整腸剤です。

1回2錠 1日3回 毎食後 定期的に服用します。

下痢が起こる前から予防的に服用を続けましょう。

下痢が起こったときに服用するお薬：ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」



下痢を止める作用があります。

下痢が起こったら、1カプセル服用してください。

副作用・日常生活における注意点

眠気・ふらつきが現れることがありますので、自動車運転など危険を伴う機械の操作はしないでください。

ベージニオ錠による下痢の対応方法

(最も警戒すべき時期は「最初の1週間」です)

下痢のコントロール目標は、「やや軟らかい便(下図の5番)」です。

ベージニオを服用して、**下痢(⑥泥状便)**が起きた場合

我慢せずに、ロペラミドを1カプセル服用と水分補給をしてください

- 治らない場合、2時間以上 間隔をあけてロペラミドを1カプセル追加し、服用してください。
- 1日6回 使用しても治らない場合は、病院へご連絡してください。

便が出にくい時は、ご自身でロペミンの量の調節や中止をしてください

1	コロコロ便		硬くてコロコロの兔糞状の便
2	硬い便		ソーセージ状であるが硬い便
3	やや硬い便		表面にひび割れのあるソーセージ状の便
4	普通便		表面がなめらかでやわらかいソーセージ状の便
5	やや軟らかい便		はっきりとした断片のあるやわらかい半分固形の便
6	泥状便		端が崩れて、ふにやふにやの不定形の便
7	水様便		固形物を含まない液体状の便

下痢の状態に合わせたロペミンの使い方(例)

「外出時に下痢が起こらないか不安な場合」

- ▶ いつでも服用できるようにロペミンを携帯
- ▶ 外出する前にロペミン1カプセルを服用



「決まった時間に下痢が起こる場合」

- (例) いつも午前中に下痢が起こる場合
- ▶ 朝食後にロペミン1カプセルを服用



ベージニオにより 間質性肺疾患 が起こることがあります。

注意が必要な症状：息切れ、咳、発熱

- ▶ 間質性肺疾患があらわれることがあります。
間質性肺疾患は、息切れや咳、発熱などの症状が見られます。
- ▶ 間質性肺疾患は、急に重篤化して死亡に至る可能性があるため、早期発見と早期治療が大切です。

下記のような場合には病院に速やかに連絡しましょう

以下のような症状がある場合、病院に連絡をして下さい。

- 階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる
- 空咳(痰のない咳)が出る
- 発熱する など



間質性肺疾患が疑われる症状です

- めまい、頭痛がする
- 尿の量が減ったり、色が濃くなったりする
- 水分がとれない など



下痢による脱水が疑われる症状です

- ロペラミドを1日に6回使用しても症状が回復しない
- 激しい腹痛や嘔吐
- 発熱、空咳、息苦しい
- 飲食が出来ない
- 血便・黒色便
- めまいやだるさが強い


緊急連絡先

医療機関名	山梨厚生病院
診療科名	乳腺外科
担当医名	
電話番号	0553-23-1311

困ったら・・・リリーお薬相談窓口のご案内（365日・電話/LINE）

- LINEチャットで
- お電話で

みなさまの疑問に
お答えします。



副作用のことを
知りたい

先生に
聞きそびれて
しまった

再発の不安を
誰かに
聞いてほしい

365日
9～21時

専門知識
がある
スタッフが
対応

疑問や
お困りごとも
お気軽に



- ▶ ベージニオを服用されている患者さん及びご家族の皆さん、乳がん治療を安心して続けて頂けるように支援する相談窓口です。

リリーお薬相談窓口のご案内（電話）

0120-526-062
365日年中無休/9時～21時

リリーお薬相談窓口のご案内（LINE）

初回のみ登録が必要です。
その後は継続してご利用
いただけます。



注) 患者さんの症状や治療内容に関する個別アドバイスは医療行為にあたるため、提供していません。