

対象患者：胃癌

レジメン名：CapeOX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	2時間	○						
4	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4

投与時間：2時間30分

備考：

上記と合わせてカペシタビンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・ BSA<1.36：2400mg/day 分2
- ・ 1.36≦BSA<1.66：3000mg/day 分2
- ・ 1.66≦BSA<1.96：3600mg/day 分2
- ・ 1.96≦BSA：4200mg/day 分2