

対象患者：大腸癌

レジメン名：FTD/TPI+BEV

1コースの日数：28日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	～	8	～	15	～	22	～	28
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				○				
2	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目)	○				○				
	生理食塩液	100mL			1時間(2回目) 30分(3回目以降)									
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				○				

点滴順序：Rp1→2→3

投与時間：1時間30分(1回目)、1時間(2回目)、30分(3回目以降)

備考：

上記と合わせてロンサーフ®を下記の用法・用量にてday1の夕食後からday6の朝食後まで内服し、再度day8の夕食後からday13の朝食後まで内服する。

- ・ BSA<1.07：70mg/day 分2
- ・ 1.07≦BSA<1.23：80mg/day 分2
- ・ 1.23≦BSA<1.38：90mg/day 分2
- ・ 1.38≦BSA<1.53：100mg/day 分2
- ・ 1.53≦BSA<1.69：110mg/day 分2
- ・ 1.69≦BSA<1.84：120mg/day 分2
- ・ 1.84≦BSA<1.99：130mg/day 分2
- ・ 1.99≦BSA<2.15：140mg/day 分2
- ・ 2.15≦BSA：150mg/day 分2