

対象患者：尿路上皮癌

レジメン名：GP

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ゲムシタピン：分類不能

パクリタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	16.5mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分			○		○		
3	ゲムシタピン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○		
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	3時間	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○		

点滴順序(day1)：Rp1→3→4→5

点滴順序(day8,15)：Rp2→3→5

投与時間(day1)：4時間

投与時間(day8,15)：1時間

備考：

パクリタキセル使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。