

対象患者：胃癌

レジメン名：Nivo+SOX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ニボルマブ：非壊死起因性抗がん薬

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	2時間	○						
7	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：3時間

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・BSA<1.25：80mg/day 分2
- ・1.25≦BSA<1.5：100mg/day 分2
- ・1.5≦BSA：120mg/day 分2

ニボルマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。