

対象患者：胆道癌

レジメン名：GEM+CDDP+S-1

1コースの日数：14日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ゲムシタビン：分類不能

シスプラチン：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day				
						1	～	8	～	14
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○				
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
3	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○				
4	硫酸Mg補正液 維持液	8mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○				
5	シスプラチン 生理食塩液	25mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○				
6	生理食塩液	500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○				

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6

投与時間：4時間

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day8の朝食後まで内服する。

- ・BSA<1.25：80mg/day 分2
- ・1.25≦BSA<1.5：100mg/day 分2
- ・1.5≦BSA：120mg/day 分2