

対象患者：膀胱癌

レジメン名：GEM + nab-PTX

1コースの日数：28日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ゲムシタビン：分類不能

パクリタキセル アルブミン懸濁型：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	～	8	～	15	～	22	～	28
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 6.6mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
3	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	125mg/m ² (投与量÷5)mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
5	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6

投与時間：1時間30分

備考：

パクリタキセル アルブミン懸濁型はフィルター付き専用ルートを使用禁止とする。