

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：PEM+BEV

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペメトレキセド：非壊死起因性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	~	8	~	15	~	21
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	10分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	ベバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5

投与時間：2時間10分(1回目)、1時間40分(2回目)、1時間10分(3回目以降)

備考：

治療開始1週間前より、副作用予防としてビタミンB₁₂ 1mg(9週毎筋注)および葉酸 0.5mg(連日内服)を投与する。