

対象患者：胃癌

レジメン名：S-1+DTX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ドセタキセル：壊死起因性抗がん薬

| Rp. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法も含む) | 標準投与量           | 投与方法 | 投与ルート  | 投与時間 | day |   |   |   |    |   |    |
|-----|------------------------|-----------------|------|--------|------|-----|---|---|---|----|---|----|
|     |                        |                 |      |        |      | 1   | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 21 |
| 1   | デキサメタゾン<br>生理食塩液       | 6.6mg<br>50mL   | 点滴静注 | メインルート | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 2   | ドセタキセル<br>5%ブドウ糖液      | 40mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | メインルート | 1時間  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 3   | 生理食塩液                  | 50mL            | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |

点滴順序：Rp1→2→3

投与時間：1時間30分

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・BSA<1.25：80mg/day 分2
- ・1.25≦BSA<1.5：100mg/day 分2
- ・1.5≦BSA：120mg/day 分2

術後補助化学療法として、1コース目はS-1単剤(21日を1コースとしてday1-14に内服)、2～7コース目まで本レジメンを施行する。

8コース目以降はS-1単剤(42日を1コースとしてday1-28に内服)を術後1年まで継続する。