

対象患者：膵癌

レジメン名：mFOLFIRINOX

1コースの日数：14日

催吐性リスク：高度

血管外漏出リスク

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

イリノテカン：炎症性抗がん薬

フルオロウラシル：炎症性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day				
						1	～	8	～	14
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴静注	メインルート	30分	○				
2	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	2時間	○				
4	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	側管	2時間	○				
5	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
6	イリノテカン 生理食塩液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○				
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
8	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² (115-投与量)mL	持続静注	メインルート	46時間	○				

点滴順序：Rp1→2→3(4)→5→6→7→8

投与時間：50時間

備考：

Rp3,4は同時投与する。

Rp8はインフューザーポンプを使用する。

制吐剤として下記を内服する。

- ・オランザピン5mg/day 分1(day1-4) *糖尿病既往の患者は使用禁止
- ・デキサメタゾン8mg/day 分2(day2-4)