

対象患者：胃癌

レジメン名：T-DXd

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度(NCCN：高度)

血管外漏出リスク

トラスツズマブ デルクステカン：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 9.9mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	トラスツズマブ デルクステカン 5%ブドウ糖液	6.4mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 30分(2回目以降)	○						
4	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4

投与時間：2時間(1回目)、1時間(2回目以降)

備考：

トラスツズマブ デルクステカン使用のため、フィルター付き専用ルートを使用し、遮光して投与する。

制吐剤として下記を内服する。

- ・オランザピン5mg/day 分1(day1-4) *糖尿病既往の患者は使用禁止
- ・デキサメタゾン8mg/day 分2(day2-4)