

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：CDDP+DTX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：高度

血管外漏出リスク

シスプラチン：報告なし

ドセタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	60mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
4	硫酸Mg補正液 維持液	4mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
5	マンニトールS注射液®	150mL	点滴静注	メインルート	15分	○						
6	シスプラチン 生理食塩液	80mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
7	生理食塩液	500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
8	硫酸Mg補正液 維持液	4mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7→8

投与時間：5時間45分

備考：

制吐剤として下記を内服する。

- ・ アプレピタント125mg/day 分1(day1)、80mg/day 分1(day2-3)
- ・ オランザピン5mg/day 分1(day1-4) *糖尿病既往の患者は使用禁止
- ・ デキサメタゾン8mg/day 分2(day2-4)

シスプラチン投与終了までに1L程度の経口補液を患者に促す。