

対象患者：大腸癌

レジメン名：CAPOX+BEV

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目)	○						
	生理食塩液	100mL			1時間(2回目)							
					30分(3回目以降)							
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
	ホスネツピタント デキサメタゾン	235mg 4.95mg										
5	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	メインルート	2時間	○						
	5%ブドウ糖液	500mL										
7	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：4時間(1回目)、3時間30分(2回目)、3時間(3回目以降)

備考：

上記と合わせてカペシタピンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・ BSA<1.36：2400mg/day 分2
- ・ 1.36≦BSA<1.66：3000mg/day 分2
- ・ 1.66≦BSA<1.96：3600mg/day 分2
- ・ 1.96≦BSA：4200mg/day 分2