

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：CBDCA+CPT-11(NSCLC)

1コースの日数：28日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

カルボプラチン：炎症性抗がん薬

イリノテカン：炎症性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	～	8	～	15	～	22	～	28
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○								
2	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	点滴静注	メインルート	30分			○		○				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
4	イリノテカン 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○		○		○				
5	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○								
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				

点滴順序(day1)：Rp1→3→4→5→6

投与時間(day1)：3時間

点滴順序(day8,15)：Rp2→3→4→6

投与時間(day8,15)：2時間

備考：