

対象患者：非小細胞肺癌
 レジメン名：CBDCA + nab-PTX
 1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
 血管外漏出リスク
 カルボプラチン：炎症性抗がん薬
 パクリタキセル アルブミン懸濁型：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分			○		○		
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○		
4	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100mg/m ² (投与量÷5)mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○		
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○		
6	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=6 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序(day1)：Rp1→3→4→5→6→7

投与時間(day1)：2時間

点滴順序(day8,15)：Rp2→3→4→5

投与時間(day8,15)：1時間

備考：

パクリタキセル アルブミン懸濁型はフィルター付き専用ルートを使用禁止とする。