

対象患者：非小細胞肺癌
 レジメン名：CBDCA+PEM
 1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
 血管外漏出リスク
 カルボプラチン：炎症性抗がん薬
 ペメトレキセド：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	10分	○						
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5

投与時間：1時間40分

備考：
 治療開始1週間前より、副作用予防としてビタミンB₁₂ 1mg(9週毎筋注)および葉酸 0.5mg(連日内服)を投与する。
 4コース終了後、増悪を認めなければPEM単剤の維持療法を考慮する。