

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：CBDCA+PEM+BEV

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

カルボプラチン：炎症性抗がん薬

ペメトレキセド：非壊死起因性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	10分	○						
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	ベバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：3時間10分(1回目)、2時間40分(2回目)、2時間10分(3回目以降)

備考：

治療開始1週間前より、副作用予防としてビタミンB₁₂ 1mg(9週毎筋注)および葉酸 0.5mg(連日内服)を投与する。

4コース終了後、増悪を認めなければPEM+BEVの維持療法を考慮する。