

対象患者：大腸癌

レジメン名：CAPIRI+BEV

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

イリノテカン：炎症性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	イリノテカン 生理食塩液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：3時間30分(1回目)、3時間(2回目)、2時間30分(3回目以降)

備考：

上記と合わせてカペシタビンを下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・ BSA<1.31：1800mg/day 分2
- ・ 1.31≦BSA<1.69：2400mg/day 分2
- ・ 1.69≦BSA<2.07：3000mg/day 分2
- ・ 2.07≦BSA：3600mg/day 分2