

対象患者：非小細胞肺癌
 レジメン名：CBDCA+VNR
 1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
 血管外漏出リスク
 カルボプラチン：炎症性抗がん薬
 ビノレルビン：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
2	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
3	ビノレルビン 5%ブドウ糖液	25mg/m ² 50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
4	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分			○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5

投与時間(day1)：1時間35分

点滴順序(day8)：Rp2→3→6

投与時間(day8)：5分

備考：

ビノレルビンの血管外漏出時は冷却しない(院内マニュアルを参照)。