

対象患者：大腸癌

レジメン名：IRI+BEV

1コースの日数：14日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

イリノテカン：炎症性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day				
						1	～	8	～	14
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
2	ベバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(初回) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
4	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
6	イリノテカン 生理食塩液	150mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○				
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：3時間30分(1回目)、3時間(2回目)、2時間30分(3回目以降)

備考：