

対象患者：胃癌

レジメン名：Pembro+T-mab+SOX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ペムブロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

トラスツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg(1回目) 6mg/kg(2回目以降) 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 30分(2回目以降)	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
7	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
8	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	2時間	○						
9	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7→8→9

投与時間：4時間30分(1回目)、3時間30分(2回目以降)

備考：

ペムブロリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・BSA<1.25：80mg/day 分2
- ・1.25≦BSA<1.5：100mg/day 分2
- ・1.5≦BSA：120mg/day 分2