

対象患者：大腸癌
 レジメン名：SIRB
 1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
 血管外漏出リスク
 イリノテカン：炎症性抗がん薬
 ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

| Rp. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む) | 標準投与量 | 投与方法 | 投与ルート | 投与時間 | day | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|------|--------|---------------------------------------|-----|---|---|---|----|---|----|
| | | | | | | 1 | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 21 |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メインルート | 5分 | ○ | | | | | | |
| 2 | ベバシズマブ 生理食塩液 | 7.5mg/kg 100mL | 点滴静注 | メインルート | 1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降) | ○ | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メインルート | 5分 | ○ | | | | | | |
| 4 | パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン | 0.75mg 235mg 4.95mg | 点滴静注 | メインルート | 30分 | ○ | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メインルート | 5分 | ○ | | | | | | |
| 6 | イリノテカン 生理食塩液 | 150mg/m ² 250mL | 点滴静注 | メインルート | 1時間30分 | ○ | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メインルート | 5分 | ○ | | | | | | |

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7

投与時間：3時間30分(1回目)、3時間(2回目)、2時間30分(3回目以降)

備考：

上記と合わせてS-1を下記の用法・用量にてday1の夕食後から開始し、day15の朝食後まで内服する。

- ・BSA<1.25：80mg/day 分2
- ・1.25≦BSA<1.5：100mg/day 分2
- ・1.5≦BSA：120mg/day 分2