対象患者：乳癌
レジメン名：ペムブロリズマブ＋PTX
1コースの日数：84日

催吐性リスク：軽度
血管外漏出リスク
ペムブロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬
パクリタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 （溶解液、支持療法も含む）	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day																							
						1	～	8	～	15	～	22	～	29	～	36	～	43	～	50	～	57	～	64	～	71	～	78	～	84
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						○						○						○						
2	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						○						○						○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						○						○						○						
4	デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				○		○		○				○		○		○				
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	90mg/㎡ 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○		○				○		○		○				○		○		○				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				○		○		○				○		○		○				

点滴順序(day1,43,64)：Rp1→2→3→4→5→6
点滴順序(day8,15,29,36,57,71)：Rp4→5→6
点滴順序(day22)：Rp1→2→3

投与時間(day1,43,64)：2時間
投与時間(day8,15,29,36,57,71)：1時間30分
投与時間(day22)：30分

備考：
ペムブロリズマブ、パクリタキセル使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。