

対象患者：尿路上皮癌

レジメン名：ペムブロリズマブ+EV

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペムブロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

エンホルツマブ ベドチン：不明

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
2	エンホルツマブ ベドチン 生理食塩液	1.25mg/kg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	30分(1回目) 15分(2回目以降)	○						
4	ペムブロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5

投与時間(day1)：2時間(1回目),1時間45分(2回目以降)

点滴順序(day8)：Rp1→2→5

投与時間(day8)：1時間

備考：

ペムブロリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

エンホルツマブ ベドチンは以下の通りに減量する。

- ・1段階減量：1.0mg/kg
- ・2段階減量：0.75mg/kg
- ・3段階減量：0.5mg/kg