

対象患者：大腸癌

レジメン名：mFOLFOX6(入院)

1コースの日数：14日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

フルオロウラシル：炎症性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day				
						1	～	8	～	14
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○				
2	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	2時間	○				
4	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	点滴静注	側管	2時間	○				
5	フルオロウラシル 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	急速静注	メインルート	5分	○				
6	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
7	フルオロウラシル 生理食塩液	2400mg/m ² 500mL	持続静注	メインルート	46時間	○				
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				

点滴順序：Rp1→2→3(4)→5→6→7→8

投与時間：48時間30分

備考：

Rp3,4は同時投与する。