

対象患者：乳癌

レジメン名：ペムプロリズマブ+GEM+CBDCA

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ペムプロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

カルボプラチン：炎症性抗がん薬

ゲムシタビン：分類不能

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ペムプロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 6.6mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
6	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
7	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=2 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○				
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5→6→7→8

投与時間(day1)：2時間30分

点滴順序(day8)：Rp4→5→6→7→8

投与時間(day8)：2時間

備考：

ペムプロリズマブ使用時は、フィルター付き専用ルートを使用する。