

対象患者：腎細胞癌  
レジメン名：ニボルマブ(q4w)  
1コースの日数：28日

催吐性リスク：最小度  
血管外漏出リスク  
ニボルマブ：非壊死起因性抗がん薬

| Rp. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法も含む) | 標準投与量               | 投与方法 | 投与ルート  | 投与時間 | day |   |   |   |    |   |    |   |    |
|-----|------------------------|---------------------|------|--------|------|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|
|     |                        |                     |      |        |      | 1   | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 22 | ～ | 28 |
| 1   | 生理食塩液                  | 50mL                | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |   |    |
| 2   | ニボルマブ<br>生理食塩液         | 480mg/body<br>100mL | 点滴静注 | メインルート | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |   |    |
| 3   | 生理食塩液                  | 50mL                | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |   |    |

点滴順序：Rp1→2→3  
投与時間：30分

備考：  
ニボルマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。