

対象患者：胆道癌

レジメン名：デュルバルマブ+GEM+CDDP

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

デュルバルマブ：非壊死起因性抗がん薬

ゲムシタビン：分類不能

シスプラチン：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	デュルバルマブ 生理食塩液	1500mg/body* 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
6	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
7	硫酸Mg補正液 維持液	8mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○				
8	シスプラチン 生理食塩液	25mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○				
9	生理食塩液	500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5→6→7→8→9

投与時間(day1)：5時間

点滴順序(day8)：Rp4→5→6→7→8→9

投与時間(day8)：4時間

備考：

デュルバルマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

*体重30kg以下の場合は、20mg/kgとする。

8コース終了後、増悪を認めなければデュルバルマブ単剤投与を継続する。