

対象患者：乳癌

レジメン名：ペルツズマブ+トラスツズマブ+DTX(初回入院)

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペルツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

トラスツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

ドセタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day							
						1	2	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○							
2	ペルツズマブ 生理食塩液	840mg/body 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○							
3	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○							
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○							
5	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分		○						
6	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間		○						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分		○						

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4

投与時間(day1)：2時間30分

点滴順序(day2)：Rp5→6→7

投与時間(day2)：1時間30分

備考：

1コース目は、infusion reactionやアレルギー症状の発現頻度が高いため、2日間に分けて実施することが多い。

2コース目以降、day1に全薬剤を投与する。