

対象患者：乳癌

レジメン名：ペルツズマブ+トラスツズマブ+PTX

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペルツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

トラスツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

パクリタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ペルツズマブ 生理食塩液	840mg/body(1回目) 420mg/body(2回目以降) 250mL	点滴静注	メインルート	1時間(1回目) 30分(2回目以降)	○						
3	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg(1回目) 6mg/kg(2回目以降) 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 30分(2回目以降)	○						
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
5	デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○		
6	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○		○		
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○		

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5→6→7

点滴順序(day8,15)：Rp5→6→7

投与時間(day1)：4時間(1回目)、2時間30分(2回目以降)

投与時間(day8,15)：1時間30分

備考：

パクリタキセル使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。