

対象患者：大腸癌

レジメン名：mFOLFOX6+BEV(入院)

1コースの日数：14日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

オキサリプラチン：壊死起因性抗がん薬

フルオロウラシル：炎症性抗がん薬

ペバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day				
						1	～	8	～	14
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
2	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目)	○				
	生理食塩液	100mL			1時間(2回目)					
					30分(3回目以降)					
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
4	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	メインルート	30分	○				
	デキサメタゾン	4.95mg								
	ホスネツピタント	235mg								
5	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	メインルート	2時間	○				
	5%ブドウ糖液	250mL								
7	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	側管	2時間	○				
	5%ブドウ糖液	250mL								
8	フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	メインルート	5分	○				
	5%ブドウ糖液	50mL								
9	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				
10	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続静注	メインルート	46時間	○				
	生理食塩液	500mL								
11	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6(7)→8→9→10→11

投与時間：50時間(1回目)、49時間30分(2回目)、49時間(3回目以降)

備考：

Rp6,7は同時投与する。