

対象患者：非小細胞肺癌  
レジメン名：アテゾリズマブ(術後)  
1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度  
血管外漏出リスク  
アテゾリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

| Rp. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法も含む) | 標準投与量                | 投与方法 | 投与ルート  | 投与時間                   | day |   |   |   |    |   |    |
|-----|------------------------|----------------------|------|--------|------------------------|-----|---|---|---|----|---|----|
|     |                        |                      |      |        |                        | 1   | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 21 |
| 1   | 生理食塩液                  | 50mL                 | 点滴静注 | メインルート | 5分                     | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 2   | アテゾリズマブ<br>生理食塩液       | 1200mg/body<br>250mL | 点滴静注 | メインルート | 1時間(1回目)<br>30分(2回目以降) | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 3   | 生理食塩液                  | 50mL                 | 点滴静注 | メインルート | 5分                     | ○   |   |   |   |    |   |    |

点滴順序：Rp1→2→3  
投与時間：1時間(1回目)、30分(2回目以降)

備考：  
アテゾリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。  
術後：1年間投与