

対象患者：小細胞肺癌
レジメン名：CBDCA+ETP(再投与)
1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
血管外漏出リスク
カルボプラチン：炎症性抗がん薬
エトポシド：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	2	3	～	8	～	15	～	21
1	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン	0.75mg 235mg 4.95mg	点滴静注	メインルート	30分	○								
2	デキサメタゾン 生理食塩液	3.3mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分		○	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○								
4	エトポシド 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○	○	○						
5	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=5 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○								
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○	○	○						

点滴順序(day1)：Rp1→3→4→5→6
点滴順序(day2,3)：Rp2→4→6

投与時間(day1)：3時間
投与時間(day2,3)：2時間

備考：
エトポシド使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。
最大6コース