対象患者：乳癌

レジメン名：ペルツズマブ+トラスツズマブ+HAL(初回入院)

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペルツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

トラスツズマブ：非壊死起因性抗がん薬

エリブリン：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day							
						1	2	~	8	~	15	~	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○							
2	ペルツズマブ 生理食塩液	840mg/body 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○							
3	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg 250mL	点滴静注	メインルート	1時間30分	○							
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○							
5	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分		○		○				
6	エリブリン 生理食塩液	1.4mg/m ² 50mL	点滴静注	メインルート	5分		○		○				
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分		○		○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4

投与時間(day1)：2時間30分

点滴順序(day2,8)：Rp5→6→7

投与時間(day2,8)：30分

備考：

1コース目は、infusion reactionやアレルギー症状の発現頻度が高いため、2日間(day1,2)に分けて実施することが多い。

2コース目以降、day1に全薬剤を投与する。