

対象患者：乳癌
レジメン名：ベムプロリズマブ+nab-PTX
1コースの日数：84日

催吐性リスク：軽度
血管外漏出リスク
ベムプロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬
パクリタキセル アルブミン懸濁型：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day																											
						1	～	8	～	15	～	22	～	29	～	36	～	43	～	50	～	57	～	64	～	71	～	78	～	84			
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						○						○															
2	ベムプロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						○						○															
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						○						○															
4	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				○		○		○			○		○		○								
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				○		○		○			○		○		○								
6	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100mg/m ² (投与量÷5)mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				○		○		○			○		○		○								
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				○		○		○			○		○		○								

点滴順序(day1,43,64)：Rp1→2→3→4→5→6→7
点滴順序(day8,15,29,36,57,71)：Rp4→5→6→7
点滴順序(day22)：Rp1→2→3

投与時間(day1,43,64)：1時間30分
投与時間(day8,15,29,36,57,71)：1時間
投与時間(day22)：30分

備考：

ベムプロリズマブ使用時は、フィルター付き専用ルートを使用する。

パクリタキセル アルブミン懸濁型はフィルター付き専用ルートを使用禁止とする。

Rp3投与後、フィルター付き専用ルートは破棄する。Rp4以降、新規ルート(フィルターなし)を接続し、投与再開する。