

対象患者：非小細胞肺癌  
 レジメン名：アテゾリズマブ+PEM  
 1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度  
 血管外漏出リスク  
 アテゾリズマブ：非壊死起因性抗がん薬  
 ペメトレキセド：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	メインルート	1時間(1回目) 30分(2回目以降)	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	メインルート	10分	○						
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6

投与時間：1時間40分(1回目)、1時間10分(2回目以降)

備考：  
 治療開始1週間前より、副作用予防としてビタミンB<sub>12</sub> 1mg(9週毎筋注)および葉酸 0.5mg(連日内服)を投与する。  
 アテゾリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。