

対象患者：肝細胞癌

レジメン名：アテゾリズマブ＋ベバシズマブ

1コースの日数：21日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

アテゾリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	アテゾリズマブ 生理食塩液	1200mg/body 250mL	点滴静注	メインルート	1時間(1回目) 30分(2回目以降)	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	ベバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5

投与時間：2時間30分(1回目)、1時間30分(2回目)、1時間(3回目以降)

備考：

アテゾリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。