

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：ニボルマブ+CBDCA+PTX(術前)

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ニボルマブ：非壊死起因性抗がん薬

カルボプラチン：炎症性抗がん薬

パクリタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	~	8	~	15	~	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ニボルマブ 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75mg 235mg 16.5mg 20mg 5mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	200mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	メインルート	3時間	○						
7	カルボプラチン 生理食塩液	AUC=6 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6→7→8

投与時間：5時間

備考：

ニボルマブ、パクリタキセル使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

術前：3コース