

対象患者：乳癌

レジメン名：Dato-DXd

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ダトポタマブ デルクステカン：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	アセトアミノフェン	600mg	点滴静注	メインルート	15分	○						
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
3	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75mg 235mg 4.95mg 5mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
4	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
5	ダトポタマブ デルクステカン 5%ブドウ糖液	6mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 30分(2回目以降)	○						
6	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6

投与時間：2時間15分(1回目)、1時間15分(2回目以降)

備考：

ダトポタマブ デルクステカン使用のため、フィルター付き専用ルートを使用し、遮光して投与する。

歯科医師による治療開始前および定期的な口腔ケアを考慮する(口腔粘膜炎が高頻度に発現するため)。

「ダトロウェイ® セルフケアスターターキット」の申し込み、口腔内を清潔に保つよう指導する。

口腔粘膜炎の予防または軽減のため、ダトポタマブ デルクステカン投与中は氷片等による口腔冷却(クライオセラピー)の実施を検討する。

角膜障害予防のため、人工涙液(一般用医薬品：ソフトサンティア® or なみだロートファイブ®)を毎日複数回(1日6回程度)使用するよう指導する。

原則として、コンタクトレンズの使用を控えるように指導する。