

対象患者：乳癌
レジメン名：SG
1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度
血管外漏出リスク
サシツズマブ ゴビテカン：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	～	8	～	15	～	21
1	アセトアミノフェン	600mg	点滴静注	メインルート	15分	○		○				
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
3	パロノセトロン ホスネツピタント デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.75mg 235mg 4.95mg 20mg 5mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				
5	サシツズマブ ゴビテカン 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	メインルート	3時間(1回目) 1時間(2回目以降)	○		○				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○				

点滴順序：Rp1→2→3→4→5→6

投与時間：3時間45分(1回目)、1時間45分(2回目以降)

備考：
サシツズマブ ゴビテカン使用のため、遮光して投与する。
FN予防としてペグフィルグラスチム使用を考慮する。