

対象患者：乳癌

レジメン名：【患者限定】 BEV+PTX(低用量)

1コースの日数：28日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ベバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

パクリタキセル：壊死起因性抗がん薬

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	～	8	～	15	～	22	～	28
1	デキサメタゾン ファモチジン d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
2	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	45mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	メインルート	1時間	○		○		○				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
4	ベバシズマブ 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○				○				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				○				

点滴順序(day1,15)：Rp1→2→3→4→5

点滴順序(day8)：Rp1→2→3

投与時間(day1,15)：3時間(1回目)、2時間30分(2回目)、2時間(3回目以降)

投与時間(day8)：1時間30分

備考：

パクリタキセル使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。