

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：ペムプロリズマブ+CDDP+GEM(術前)

1コースの日数：21日

催吐性リスク：高度

血管外漏出リスク

ペムプロリズマブ：非壊死起因性抗がん薬

シスプラチン：報告なし

ゲムシタビン：分類不能

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day						
						1	~	8	~	15	~	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
2	ペムプロリズマブ 生理食塩液	200mg/body 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○						
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
4	パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 9.9mg	点滴静注	メインルート	30分	○						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○						
6	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分			○				
7	ゲムシタビン 生理食塩液	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○				
8	硫酸Mg補正液 維持液	4mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
9	マンニトールS注射液®	150mL	点滴静注	メインルート	15分	○						
10	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
11	生理食塩液	500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
12	硫酸Mg補正液 維持液	4mEq 500mL	点滴静注	メインルート	1時間	○						
13	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分			○				

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5→7→8→9→10→11→12

投与時間(day1)：5時間45分

点滴順序(day8)：Rp6→7→13

投与時間(day8)：1時間

備考：

ペムプロリズマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

制吐剤として下記を内服する。

- ・アプレピタント125mg/day 分1(day1)、80mg/day 分1(day2-3)
- ・オランザピン5mg/day 分1(day1-4) \*糖尿病既往の患者は使用禁止
- ・デキサメタゾン8mg/day 分2(day2-4)

シスプラチン投与終了までに1L程度の経口補液を患者に促す。

術前：4コース

術後：ペムプロリズマブ(術後 q3w)を13コース

扁平上皮癌のみ対象