

対象患者：乳癌

レジメン名：【患者限定】 BEV+nab-PTX

1コースの日数：28日

催吐性リスク：軽度

血管外漏出リスク

ペバシズマブ：非壊死起因性抗がん薬

パクリタキセル アルブミン懸濁型：報告なし

Rp.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法も含む)	標準投与量	投与方法	投与ルート	投与時間	day								
						1	~	8	~	15	~	22	~	28
1	グラニセトロン	3mg	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
2	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
3	パクリタキセル アルブミン懸濁型 生理食塩液	100mg/m ² (投与量÷5)mL	点滴静注	メインルート	30分	○		○		○				
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○		○		○				
5	ペバシズマブ 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	メインルート	1時間30分(1回目) 1時間(2回目) 30分(3回目以降)	○				○				
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	メインルート	5分	○				○				

点滴順序(day1,15)：Rp1→2→3→4→5→6

点滴順序(day8)：Rp1→2→3→4

投与時間(day1,15)：2時間30分(1回目)、2時間(2回目)、1時間30分(3回目以降)

投与時間(day8)：1時間

備考：

--