

対象患者：非小細胞肺癌

レジメン名：ニボルマブ+CBDCA+GEM(術前)

1コースの日数：21日

催吐性リスク：中等度

血管外漏出リスク

ニボルマブ：非壊死起因性抗がん薬

カルボプラチン：炎症性抗がん薬

ゲムシタビン：分類不能

| Rp. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法も含む)         | 標準投与量                          | 投与方法 | 投与ルート  | 投与時間 | day |   |   |   |    |   |    |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|--------|------|-----|---|---|---|----|---|----|
|     |                                |                                |      |        |      | 1   | ~ | 8 | ~ | 15 | ~ | 21 |
| 1   | 生理食塩液                          | 50mL                           | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 2   | ニボルマブ<br>生理食塩液                 | 360mg/body<br>100mL            | 点滴静注 | メインルート | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 3   | 生理食塩液                          | 50mL                           | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 4   | パロノセトロン<br>ホスネツピタント<br>デキサメタゾン | 0.75mg<br>235mg<br>4.95mg      | 点滴静注 | メインルート | 30分  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 5   | 生理食塩液                          | 50mL                           | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 6   | グラニセトロン                        | 3mg                            | 点滴静注 | メインルート | 30分  |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 7   | ゲムシタビン<br>生理食塩液                | 1250mg/m <sup>2</sup><br>100mL | 点滴静注 | メインルート | 30分  | ○   |   | ○ |   |    |   |    |
| 8   | カルボプラチン<br>生理食塩液               | AUC=5<br>250mL                 | 点滴静注 | メインルート | 1時間  | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 9   | 生理食塩液                          | 50mL                           | 点滴静注 | メインルート | 5分   | ○   |   | ○ |   |    |   |    |

点滴順序(day1)：Rp1→2→3→4→5→7→8→9

投与時間(day1)：2時間30分

点滴順序(day8)：Rp6→7→9

投与時間(day8)：1時間

備考：

ニボルマブ使用のため、フィルター付き専用ルートを使用する。

術前：3コース

扁平上皮癌のみ対象